

MemoVet

Dosierungsvorschläge für Arzneimittel bei kleinen Wiederkäuern und Neuweltkameliden

MemoVet

Bearbeitet von
Ilka U. Emmerich, Martin Ganter, Thomas Wittek

1. Auflage 2016. Broschüren im Ordner. ca. 224 S. Spiralbindung
ISBN 978 3 7945 3168 4
Format (B x L): 12 x 18,5 cm
Gewicht: 283 g

[Weitere Fachgebiete > Medizin > Veterinärmedizin > Veterinärmedizin: Großtiere & Nutztiere](#)

Zu [Inhaltsverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Wirkstoff	VO (EU) Nr. 37/2010 ^a	Beispiele für Handelspräparate ^b	Wirkung	Indikation
Abamectin	1a (S ^{III})	kein ☐ oder ☒ in Deutschland verfügbar	Endektozid, makrozyklisches Lacton	Befall mit gastrointestinalen Nematoden, Lungenwürmern und Nasendasseln
Abamectin [A] (+ Derquantel [D])	[A]: 1a (S ^{III}) [D]: 1a (S ^{III})	GB: Startect Dual-Active Oral ([A] 1 mg + [D] 10 mg/ml Lsg.) ☐ [S (14/-)] (Zoetis)	[A]: Endektozid, makrozyklisches Lacton [D]: Anthelminthikum gegen Nematoden	Befall mit gastrointestinalen Nematoden, Lungenwürmern und Nasendasseln
Acepromazin	3	Vetranquil 1 % (10 mg/ml Inj.-Lsg.) ☐ (CEVA Tiergesundheit)	Antiemetikum, Neuroleptikum, Prokinetikum, Sedativum	a) Sedation b) Tetanie
Acepromazin + Ketamin s. Ketamin				
Acepromazin + Etorphin s. Etorphin				
Acetazolamid	3	Diamox parenteral (500 mg TS/Flasche) ☐ (Goldshield)	Diuretikum, Carboanhydrase-Hemmstoff	metabolische Alkalose, Glaukom
Acetylcystein (ACC)	1b (LMT)	Equimucin 2 g (333 mg/g Pulver) ☐ (CP-Pharma)	Expektorans, Mukolytikum	Mukolyse, Sekretolyse
Acetylsalicylsäure	1b (LMT, außer Fisch)	ASS 100 % (1 g/g) ☐ (KLAT-Chemie), Pyrinagil 100 % (1 g/g) ☐ (Veyx-Pharma)	Hemmstoff der Prostaglandinsynthese, Thrombozytenaggregationshemmer, Analgetikum, Keratolytikum	Schmerzbekämpfung, Analgesie, Entzündungshemmung, Koagulationshemmung

20 Dosierungsvorschläge

Emmerich: Dosierungsvorschläge für
Arzneimittel bei kleinen Wiederkäuern und Neuweltkameliden.

ISBN: 978-3-7945-3168-4. © Schattauer GmbH

Nebenwirkungen, Besonderheiten	Kontra-indikationen	Dosierung
NWK: keine bekannt	Resistenz gegenüber makrozyklischen Lactonen	NWK: 0,2–0,3 mg/kg, s. c., einmalig Schaf: 0,2 mg/kg, s. c., einmalig
[D]: neuer Wirkmechanismus: Antagonist am nikotinischen Acetylcholinrezeptor (nAChR); Schaf: leichtes, vorübergehendes Husten nach Tränken	Resistenz gegenüber makrozyklischen Lactonen oder Derquantel	Schaf: [A] 0,2 mg + [D] 2 mg/kg, p. o., einmalig
NWK: durch andere Sedativa ersetzbar	kl. Wdk, NWK: keine bekannt	Alpaka: a) 0,05–0,1 mg/kg, i. v., i. m., s. c. Schaf: a) 0,05–0,1 mg/kg, i. m. b) 0,01–0,05 mg/kg, i. v. Ziege: a) 0,05–0,1 mg/kg, i. m. b) 0,2 mg/kg, i. m.
NWK: keine bekannt, da Wirkstoff wissenschaftlich nicht erwähnt	NWK: keine bekannt, da Wirkstoff wissenschaftlich nicht erwähnt	Schaf: 6–8 mg/kg, i. v., i. m., s. c. Ziege: 6–8 mg/kg, i. v., i. m., s. c.
NWK: keine bekannt	NWK: keine bekannt	Schaf: Initialdosis: 140 mg/kg, Erhaltungsdosis: 70 mg/kg, per inhalationem; 5–10 ml eines 10%igen Aerosols (100 mg/ml) pro 50 kg, 2 × tgl. Ziege: Initialdosis: 140 mg/kg, Erhaltungsdosis: 70 mg/kg, per inhalationem; 5–10 ml eines 10%igen Aerosols (100 mg/ml) pro 50 kg, 2 × tgl.
NWK: in der Regel parenteral anwendbare NSAIDs genutzt	kl. Wdk: NWK: keine bekannt	Alpaka: 5–100 mg/kg, p. o., 2 × tgl. Lama: 5–100 mg/kg, p. o., 2 × tgl. Schaf: 100 mg/kg, p. o., 2 × tgl. Ziege: 100 mg/kg, p. o., 2 × tgl.